

濃紅色で尻詰まりの良い早生ニンジン

ゆうべに

YUBENI (旧名: YCC103)



取扱い規格
コトL 10,000粒


品種特性

1. 根色・肉色ともに鮮やかな濃紅色で、肌が滑らかで艶があります。
2. 根形は肩張りが良い円筒形で、尻部までよく太り収量が期待できます。
3. 草姿は立性で初期より旺盛に生育し、地上部は強健で機械収穫に向きます。
4. 愛紅より晩抽性があり、冬播きトンネル栽培でも抽苔が発生しにくいです。

栽培上の留意点

1. 発芽から生育初期の乾燥および過湿には注意して下さい。
2. 最終間引き後に土寄せを励行して肩着色の発生を防止して下さい。
3. 適切な防除を心掛け黒葉枯病の発生に注意して下さい。

作型



● 播種期 ■ 収穫期 ※作型表は栽培方法、地域で若干異なることが有ります。



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com/>

【本社】

〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4-6-17

Tel. 06-6204-1877
Fax. 06-6204-0166

【東日本営業所】

〒323-0022
栃木県小山市駅東通2-37-3

Tel. 0285-23-1935
Fax. 0285-23-2169

濃紅色で尻詰まりの良い早生ニンジン

ゆうべに

YUBENI (旧名: YCC103)



取扱い規格
コトL 10,000粒


品種特性

1. 初夏まきでは、播種後110~120日で収穫可能な中早生品種です。
2. 根色・肉色ともに鮮明な濃紅色で、肌が滑らかで艶があります。
3. 根形は肩張りが良い円筒形で、尻部までよく太り収量が期待できます。
4. 草姿は立性で初期より旺盛に生育し、地上部は強健で機械収穫に向きます。

栽培上の留意点

1. 発芽から生育初期の乾燥および過湿には注意して下さい。
2. 最終間引き後に土寄せを励行して肩着色の発生を防止して下さい。
3. 適切な防除を心掛け黒葉枯病の発生に注意して下さい。

作型



● 播種期 ■ 収穫期 ※作型表は栽培方法、地域で若干異なることが有ります。



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com/>

【本社】

〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4-6-17
Tel. 06-6204-1877
Fax. 06-6204-0166

【北海道営業所】

〒067-0022
北海道江別市江別太698
Tel. 011-382-2541
Fax. 011-382-1161

SUMIKAのやさい

いそどり鮮やか、冬どり早生ニンジン

ゆうべに

YUBENI

(旧名：YCC103)



取扱い規格
コトL 10,000粒


品種特性

1. 根色・肉色ともに鮮明な濃鮮紅色で、肌が滑らかで艶がある。
2. 草姿は立性で初期より旺盛に生育し、地上部は強健で機械収穫に最適な品種です。
3. 地上部の枯上がりが遅いため、越冬どりでの機械収穫も可能です。
4. 根形は肩張りが良い円筒形、尻部までよく太り収量も期待できます。
5. 愛紅より晩抽性があり、冬播きトンネル栽培でも抽苔が発生し難い品種です。

栽培上の留意点

1. 発芽から生育初期の乾燥および過湿には注意してください。
2. 最終間引き後に土寄せを敢行して、青首の発生を防止してください。

推奨作型



● 播種期 ■ 収穫期 〰️ マルチ被覆 ※ 作型表は栽培方法、地域で若干異なることが有ります。



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com/>

【本社】

〒541-0043

Tel. 06-6204-1877

大阪府中央区高麗橋4-6-17

Fax. 06-6204-0166