

作りやすく、肌質良好、揃い抜群
多収性の早生系ニンジン

愛美

MANAMI

(旧名：YCC102)

取扱い規格
ユートL 10,000粒




品種特性

1. 愛紅に比べて、地上部の枯上がりが遅い品種です。
2. 根色・肉色ともに鮮紅色で、肌が滑らかで艶があります。
3. 草姿は立性で初期より旺盛に生育し、地上部は強健で機械収穫に最適な品種です。
4. 根形はややなで肩円筒形、尻部までよく太り形状に優れます。
5. 愛紅よりも晩抽性があり、冬播きトンネル栽培でも抽苔が発生し難い品種です。

栽培上の留意点

1. 発芽から生育初期の乾燥および過湿には注意して下さい。
2. 最終間引き後に土寄せを励行して、青首の発生を防止して下さい。

作型



● 播種期 ■ 収穫期 〰 トンネル被覆 ※ 作型表は栽培方法、地域で若干異なることが有ります。



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com/>

【本社】

【東日本営業所】

〒541-0043

〒323-0022

大阪市中央区高麗橋4-6-17

栃木県小山市駅東通2-37-3

Tel. 06-6204-1877

Tel. 0285-23-1935

Fax. 06-6204-0166

Fax. 0285-23-2169

作りやすく、多収性で揃い抜群
高品質早生ニンジンの決定版！

愛美

MANAMI

(旧名：YCC102)

取扱い規格
コトL 10,000粒




品種特性

1. 早生のニンジンで、春・夏まきで作型では、愛紅に比べ2～3日晩生の品種です。
2. 晩抽性で、春まきトンネル栽培でも抽苔発生が極めて少ない品種です。
3. 草姿は立性で初期より旺盛に生育し、機械収穫に最適な品種です。
4. 根形はややなで肩円筒形、尻部までよく太り形状に優れる。
5. 根色・肉色ともに濃鮮紅色で、肌が極めて滑らかで艶がある。

栽培上の留意点

1. 発芽から生育初期の乾燥および過湿には注意して下さい。
2. 最終間引き後に土寄せを励行して、青首の発生を防止して下さい。
3. トンネル栽培下では一般品種に比べ地上部の生育は旺盛になりますが、換気は一般品種並として下さい。必要以上に換気を早め、地上部の生育を抑えてしまうと、収量や品質に影響を及ぼす恐れがあります。ご注意下さい。

作型



※作型表は栽培方法、地域で若干異なることが有ります。



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com/>

【本社】

〒541-0043

大阪市中央区高麗橋4-6-17

Tel. 06-6204-1877

Fax. 06-6204-0166

【北海道営業所】

〒067-0022

北海道江別市江別太698

Tel. 011-382-2541

Fax. 011-382-1161

SUMIKAのやさい

早生系

作りやすく、肌質良好、揃い抜群
多収性の早生系ニンジン

愛美

MANAMI
(旧名：YCC102)

取扱い規格
ユ-TL 10,000粒




品種特性

1. 愛紅に比べて、地上部の枯上がりが遅い品種です。
2. 根色・肉色ともに鮮紅色で、肌が滑らかで艶があります。
3. 草姿は立性で初期より旺盛に生育し、地上部は強健で機械収穫に最適な品種です。
4. 根形はややなで肩円筒形、尻部までよく太り形状に優れます。
5. 愛紅よりも晩抽性があり、冬播きトンネル栽培でも抽苔が発生し難い品種です。

栽培上の留意点

1. 発芽から生育初期の乾燥および過湿には注意して下さい。
2. 最終間引き後に土寄せを励行して、青首の発生を防止して下さい。

作型



● 播種期

■ 収穫期

~~~~~ トンネル被覆

※作型表は栽培方法、地域で若干異なることがあります。



住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com/>

【本社】

〒541-0043

大阪市中央区高麗橋4-6-17

Tel. 06-6204-1877

Fax. 06-6204-0166